

Problemarzneistoffe

Aufmerksamkeit im Apothekenalltag notwendig

Antiepileptika	keine Substitution - Pharmazeutische Bedenken, Dosierung prüfen, Einnahme vor / nach dem Essen prüfen Wechselwirkung prüfen Einnahme immer zur gleichen Tageszeit Bei Unklarheiten Apotheker hinzuholen Vitaminsubstitution: Epivit®
Barbiturate	Dosis prüfen
Biphosphonate	1/2 Std. vor dem Frühstück mit Leitungswasser nach dem Aufstehen und nicht wieder hinlegen, kein Calcium retardiert, magensaftresistent: nüchtern
Diclofenac	Sonne meiden, Einnahme nach dem Essen, keine Milch, Magnesium, Eisen, Calcium
Doxycyclin	
Glaukومتropfen	regelmäßig nach Vorschrift
Gyrasehemmer	Sonne meiden, keine Milch, Magnesium, Eisen, Calcium
Itraconazol	mit dem Essen, keine Antacida (H2-Blocker, Protonenpumpenhemmer) keine Cola
Paracetamol	Dosis prüfen
Parkinsonmittel	keine Substitution - Pharmazeutische Bedenken insbes.: Madopar® LT Vitaminsubstitution: Parkovit®
Protelos®	aufgelöst, nicht mit Ca, Al, Mg, 2 Std. Abstand zum Essen, vor dem Zubettgehen einnehmen
Retinoide	zum Essen, keine Sonne, Frauen: Verhütung, Bedarf von 30 ! Tagen, Arzt