

CDS - Clinical Decision Support

Erstellt von: uniklidresden01
Datum: 2026.08.25 06:00



Patient

Alter	Geschlecht	Renale Clearance (in ml/min.):
n.A.	unbekannt	n.A.

Medikation

Acetylsalicylsäure – ASS-ratiopharm 100 mg TAH TAB - Ratiopharm (D)	⚠
Valsartan und Amlodipin – Amlodipin/Valsartan AL 5 mg/80 mg FTA - ALIUD (D)	⚠
Atorvastatin – Atorvastatin STADA 20 mg FTA - STADAPHARM (D)	✓
Solifenacin – Vesikur 5 mg FTA - Astellas (D)	⚠
Calcium, Kombinationen mit Vitamin D und/oder anderen Mitteln – Calcium-dura Vit D3 FTA - Cooper (D)	⚠
Amitriptylin – Amineurin 50 mg FTA - Hexal (D)	⚠
Doxycyclin – DoxyHEXAL tabs 100 mg TAB - Hexal (D)	⚠
Paracetamol, Kombinationen exkl. Psycholeptika – Thomapyrin INTENSIV TAB - Nattermann&Cie (D)	⚠
Naratriptan – Naratriptan AL akut 2,5 mg FTA - ALIUD (D)	✓
Diphenhydramin – Dolestan forte TAB - Holsten (D)	⚠

Risiken

Doppeltherapie: (STO) Acetylsalicylsäure	Auslöser (Acetylsalicylsäure ASS-ratiopharm 100 mg TAH TAB - Ratiopharm)	⚠
Doppeltherapie: (STO) Acetylsalicylsäure	Auslöser (Paracetamol, Kombinationen exkl. Psycholeptika Thomapyrin INTENSIV TAB - Nattermann&Cie)	⚠

Interaktionen (Stoff)

Amitriptylin Amineurin 50 mg FTA - Hexal (Amitriptylin) == Solifenacin Vesikur 5 mg FTA - Astellas (Solifenacin)	Effekt Verstärkte anticholinerge Effekte	Massnahmen Zwischen dem Ende einer Behandlung mit Solifenacin und der Anwendung anderer anticholinerg wirkender Arzneistoffe soll etwa eine Woche liegen.	
Amitriptylin Amineurin 50 mg FTA - Hexal (Amitriptylin) == Diphenhydramin Dolestan forte TAB - Holsten (Diphenhydramin)	Effekt Verstärkte anticholinerge Wirkungen	Massnahmen Es empfiehlt sich, die gleichzeitige Anwendung zu vermeiden bzw. die anticholinerge Last zu reduzieren, z. B. durch Wahl eines alternativen Arzneimittels ohne anticholinerge Wirkung oder ein Arzneimittel, bei dem keine zentralen anticholinergen Wirkungen zu befürchten sind. Ist eine gleichzeitige Anwendung unvermeidbar, sollen Patienten auf verstärkte unerwünschte anticholinerge Effekte überwacht werden.	
Diphenhydramin Dolestan forte TAB - Holsten (Diphenhydramin) == Solifenacin Vesikur 5 mg FTA - Astellas (Solifenacin)	Effekt Verstärkte anticholinerge Wirkungen	Massnahmen Die gleichzeitige Anwendung ist nicht empfohlen. Zwischen dem Ende einer Behandlung Solifenacin und der Anwendung anderer anticholinerg wirkender Arzneistoffe soll etwa eine Woche liegen.	
Doxycyclin DoxyHEXAL tabs 100 mg TAB - Hexal (Doxycyclin) <== Calcium, Kombinationen mit Vitamin D und/oder anderen Mitteln Calcium-dura Vit D3 FTA - Cooper (Calciumcarbonat)	Effekt Verminderte antimikrobielle Wirksamkeit des Tetracyclins	Massnahmen Tetracycline und polyvalente Kationen müssen zeitlich versetzt eingenommen werden. Die Empfehlungen lauten unterschiedlich (2-4 Stunden). Teilweise werden auch längere Abstände empfohlen (siehe jeweilige Fachinformation). Der Zeitabstand soll möglichst gross sein, da so die Absorption umso weniger beeinträchtigt wird. Allerdings wird die Wechselwirkung wegen des enterohepatischen Kreislaufs dadurch nicht vollständig verhindert, sondern nur minimiert. In Einzelfällen können auch Hilfsstoffe mit polyvalenten Kationen, wenn sie in entsprechender Menge enthalten sind, die Absorption beeinträchtigen. Vor und nach Einnahme von Lanthan wird ein zweistündiger Abstand zu den Tetracyclinen empfohlen.	

Paracetamol,
Kombinationen exkl.
Psycholeptika
Thomapyrin INTENSIV
TAB - Nattermann&Cie
(Acetylsalicylsäure)
==>
Valsartan und Amlodipin
Amlodipin/Valsartan AL
5 mg/80 mg FTA -
ALIUD (Valsartan)

Effekt
Verminderte
Blutdrucksenkung / Erhöhtes
Risiko von
Nierenfunktionsstörungen
und Hyperkaliämie

Massnahmen
Bei gelegentlicher Einnahme von
Acetylsalicylsäure als Analgetikum sowie bei
niedrig dosierter ASS sind keine Massnahmen
erforderlich. Wenn analgetisch-antirheumatische
ASS-Dosen (2-3 g) über längere Zeit zusammen
mit einem Angiotensin-Antagonisten gegeben
werden, sollen Blutdruck, Nierenfunktion und
Serum-Kalium besonders sorgfältig überwacht
werden. Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist
zu achten. Bei Blutdruckanstieg kann der
Angiotensin-Antagonist nach Bedarf höher
dosiert werden.

