

# Pille danach

## CYP3A4-

### Induktoren:

Antiepileptika  
Antidepressiva  
(Johanniskraut)  
HIV-Medikamente  
Tuberkulose-  
medikamente

GV vor > 5 Tage  
Alter < 14 Jahre ohne Beisein d. Eltern  
bestehende Schwangerschaft  
unkontrollierbares bzw. schweres Asthma  
schwere Leberfunktionsstörungen  
Unverträglichkeit Levonorgestrel / Ellaone®  
CYP3A4 Induktoren Einnahme  
Zyklusanamnese uneindeutig  
kein telef. o. direkter Kontakt z. Anwenderin

Arzt

Levonorgestrel bis 3 Tage postkoital  
Pidana®   
Ellaone® bis 5 Tage postkoital  
erste Wahl bei unsicherem Cyclus

Stillpause: Levonorgestrel 8 Std. / Ellaone 7 Tage  
Keine Wirksamkeit nach Eisprung  
zeitnahe Vorstellung beim Frauenarzt empf.  
Erbrechen nach Einnahme < 3 Std.: 2. Einnahme  
bei Übergewichtigen verminderte Wirkung mögl.  
Bei Einnahme Knoblauch, Grapefruit, Ingwer meiden

## Hinweise:

Eisprung ist variabel und nicht vorhersehbar

Spermien sind 5 Tage überlebensfähig

Alter < 20: Kassenrezept möglich

Nebenwirkungen: Kopfschmerzen Übelkeit Erbrechen